

# Хвороба вузлуватих ділянок шкіри

## Худоба

Нодулярний дерматит (НД) – це вірусне захворювання великої рогатої худоби, яке проявляється переважно у вигляді круглих вузликів на шкірі, часто супроводжуються лихоманкою та погіршенням самопочуття.

### Велика рогата худоба – клінічні ознаки можуть включати

- Лихоманка вище 41°C протягом тижня.
- Дрібні круглі вузлики на шкірі (2–5 см) – особливо на голові, шиї та спині.
- Вузли можуть стати болючими, розриватися та утворювати виразки з рубцевою тканиною.
- Слинотеча, нежить та слъозотеча.
- Кульгавість через набряк ніг та дискомфорт.
- Збільшення лімфатичних вузлів та можливий набряк (скупчення рідини) у вимені та грудях.
- Вузлики на слизових оболонках носа, рота, дихальних шляхів та статевих органів.

В Італії та Франції було виявлено нодулярний дерматит. На що варто звернути увагу, читайте тут.

### Інкубаційний період – коли тварини стають заразними?

Після зараження у великої рогатої худоби зазвичай проходить від 4 до 14 днів, перш ніж з'являються симптоми.

Однак, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин (WOAH), інкубаційний період може тривати до 28 днів.

В експериментах симптоми у деяких тварин спостерігалися вже через 6–9 днів. Це означає, що тварина може бути інфікованою та поширювати хворобу, не виявляючи явних ознак протягом кількох тижнів – саме тому моніторинг та швидке реагування є такими важливими.

### Шляхи передачі – як поширюється хвороба?

Хвороба нодулярного дерматиту (НДД) передається переважно комахами та кліщами, які діють як так звані механічні переносники. Це означає, що вірус не розмножується в комах, а передається від тварини до тварини, коли, наприклад, мухи, комарі або кліщі, що кусають, висмоктують кров зараженої тварини, а потім кусають іншу.

- Вірус ЗВД був виявлений у мух, кліщів та комарів після контакту з хворою худобою.
- Експерименти показали, що укуси мух та кліщів може ефективно передавати інфекцію.

### Профілактика

- Уникайте перевезення невакцинованих тварин – особливо через кордони або до нових регіонів.
- Будьте особливо обережні під час імпорту або спільні пасовища.
- Дотримання належної гігієни та прибирання.
- Дезінфекція обладнання та стайні.
- Зосередьтеся на боротьбі зі шкідниками та комахами.
- Завчасне повідомлення органів влади є важливо встановити контроль та запобігти подальшому поширенню.

