

I dette nummer kan du læse om sommerens tilbagevendende plageånd – fluer!

FLUE-SÆSONEN ER STARTET

Forebyggelse er kodeordet

Effektiv fluekontrol starter absolut senest i maj. Det er langt nemmere at forebygge en massiv flueplage, end det er at bekæmpe den.

En flue er ikke bare en flue

Forskellige fluer kræver forskellige bekæmpelses tiltag. For eksempel bekæmpes stuefluer og stikfluer bedst ved at fokusere på dybstrøelsesarealer, mens plantagefluen og efterårsfluen udklækkes i kokasser på marken.

Hvad er problemet?

Fluer er et problem set i et dyrevelfærdsmæssigt perspektiv. Dels fordi de er til voldsom gene, smerte og ubehag for dyrene, og dels fordi de kan overføre smitsomme sygdomme som for eksempel Pink Eye og Fluestik (fluemastitis).

Forebyggelse og bekæmpelse

Mange kvægbrugere har de senere år brugt pour-on midler i stort omfang. Det er i og for sig en fin løsning, men dette tiltag kan aldrig stå alene. Dernæst skal det gives ofte (ca. mellem hver 4 – 12 uge afhængig af præparat) og dels skal mælken holdes tilbage i økologiske besætninger i min. 2 dage efter behandling.



Alternativer til Pour-on behandling

Hyppig udmugning i dybstrøelsesbokse – særligt i kalvebokse hvor stuefluen har sit foretrukne opholdssted. Hyppig udmugning er optimalt set min. en gang ugentlig, da fluerne i den varmeste periode når en udvikling fra æg til voksen flue på bare 7 dage!

Daglig fjernelse af foderrester er ligesom udmugning med til at fjerne levesteder fro fluerne.

Gyllefluelarver og snyltehvepse er en mulighed ved bekæmpelse af stik- og stuefluer.

Af mere mekanisk bekæmpelse kan alt fra forstøvningsanlæg ved ædepladser og opsamlingsplads, ventilation, fluestøvsuger osv. være relevant.

For dyr på marken er det vigtigt at sikre skygge til dyrene og lavest mulig belægningsgrad.

Flue	Hvor udklækkes fluen	Problem og årstid	Bekæmpelse
Stueflue	Gødning, strøelse og foderrester	Enormt antal. Hele perioden. Irriterende.	Udmugning min. 1 gang ugentlig. Overdækning af gødningsstakke. Foderhygiejne generelt. Snyltehvepse og gyllefluelarver.
Stikflue	Gødning, strøelse, foderrester, plantemateriale i forrådnelse.	Stikker og suger blod, primært på benene af dyrene. Flest i september til oktober.	Som stueflue.
Plantage- og efterårsfluen	Kokasser på marken.	Pink Eye og Fluemastitis. Sidder primært på hovedet og på patterne.	Bekæmpelse af stikfluer, da plantage- og efterårsfluen ikke selv kan lave sår og rifter på patterne.
Den lille stikflue	Kokasser.	Suger blod på ryg, bug og patter. Kan stikke hul på pattehuden og give Fluemastitis.	Sikre skygge til køer på græs. Lav belægningsgrad på mark.